

יום שני י' שבט תשע"ז
6 פברואר 2017
סימוכין: 31892

לכבוד
חברי הוועדה לזכויות הילד

מניעת כוויות בקרב ילדים הקלות הבלתי נסבלת של ההיפגעות

בכדי להפחית את מספר הילדים הנכוים חייבים:

1. הסברה ממוקדת
2. העברת מסרים להורים במערכת הבריאות
3. אכיפת חקיקת הגבלת טמפרטורת מים בברזים

כווייה היא אחת מסיבות הפגיעה החמורות בבני אדם ובייחוד בילדים. הסבל והכאב הנגרמים לילד ולמשפחתו בעקבות היפגעות מכווייה עצומים. הם חווים תקופה ארוכה וקשה של אשפוזים, ניתוחים, השתלות עור וטיפול פיזיותרפיה מכאיבים.

כוויה מנוזלים רותחים היא הנפוצה ביותר!

3 מתוך 5 ילדים שפונים למיון עקב כוויות, נכוים מנוזלים חמים.

מים יכולים לשרוף כמו אש!



רגלו של פעוט בן שנה ו-10 חודשים שנווה מכוס קפה רותח של שהונח על שולחן נמוך במעון בו הוא שהה, על ידי אחת מעובדות צוות המעון



ליבי פטרסון בת 16 חודשים נכווהה קשות כאשר תפסה כוס תה שהונח על קצה השולחן במטבח

מדי שנה אלפי ילדים מגיעים לחדרי המיון עקב כוויות ומאות מאושפזים:

- בשנת 2015 הגיעו לחדרי המיון ולמרפאות טרם 3002 ילדים כתוצאה מכוויות (מנתוני משרד הבריאות ומרפאות טרם). בנוסף, ישנן כוויות רבות שאינן מדווחות.
- מנתוני מכון 'גרטנר' עולה כי:
 - בין השנים 2010-2015 אושפזו 6,605 איש כתוצאה מכוויות (כ-1,100 אושפזו בשנה)
 - כ-46% מכלל נפגעי הכוויות שאושפזו בבתי"ח הם ילדים בגיל 0-4, כאשר רובם המכריע נכוו מרותחין (80%)

- 59% מנפגעי הכוויות המאושפזים הם ילדים עד גיל 14 (כ-650 ילדים בשנה !)
- נפגעי כוויות מאושפזים למשך זמן ארוך יותר - 8 ימים בממוצע, לעומת 5.1 ימים
- מתוך ניתוח נתונים שערך ארגון 'בטרם' לבטיחות ילדים ב-10 בתי חולים בשנים 2010-6.2016:
 - בסופי שבוע חלה עליה בהיפגעויות ילדים מכוויה מנוזלים חמים
 - מרבית היפגעויות ילדים מכוויות התרחשו בבית ובחצר הבית - כ-50% קרו במטבח
- גם בקרב ילדים ערבים הגורם העיקרי לכוויות ילדים הוא נוזלים חמים - 65% מהילדים שאושפזו בבית החולים סורוקה בסורוקה ו-69% בבתי חולים בצפון
- הגורם השני לכוויות אצל ילדים ערבים שאושפזו בסורוקה הוא אש (21%) ואילו לילדים ערבים שאושפזו בבתי חולים בצפון הוא מוצקים חמים (11%) ואחר כך אש (10%).



המלצה לוועדה לזכויות הילד:

- בכדי לצמצם את תופעת ההיפגעויות בקרב ילדים ופעוטות כתוצאה מרותחין יש לפעול בכמה מישורים:
1. הסברה קבועה לצורך העלאת המודעות בקרב המטפלים בפעוטות
 2. העברת מסרים להורים הטריים באמצעות מערכת הבריאות (טיפות חלב, קופות חולים ועוד)
 3. אכיפת החקיקה לעניין הגבלת טמפרטורת המים בברז